

Una innovación excepcional
para aliviar su dolor... y el tuyo

- ▶ **Aplicación rápida, segura y cómoda.**
- ▶ **Sin necesidad de dar junto con la comida.**
- ▶ **Sin necesidad de tragar comprimidos.**
- ▶ **Sin necesidad de digerir la medicación.**
- ▶ **Sólo...**

¡administración asegurada!



¡La nueva manera de aliviar el dolor!

- ✓ El primer antiinflamatorio con aplicación en spray.
- ✓ Aplicación directa sobre las encías del perro.
- ✓ Medicación de fácil uso que garantiza la administración de la medicación.
- ✓ Sistema patentado de difusión que dosifica de manera suave y cómoda.
- ✓ Sin mezclar en la comida, sin esconderlo entre los premios.
- ✓ Sin tener que tragar comprimidos o jarabes.



RevitaCAM™ (meloxicam) ¡Nada que ver con lo que había hasta ahora!


ESTEVE 50
veterinaria 1963-2013

www.esteve.es

www.esteve.es

ESTEVE 50
veterinaria 1963-2013

Nada que
tragar



Nada que
digerir



Nada como
RevitaCAM™
(meloxicam)



Un avance extraordinario para
el alivio del dolor en perros

RevitaCAM™
(meloxicam)

¿Qué es **RevitaCAM**™?

- **RevitaCAM**™ (meloxicam), es un **antiinflamatorio no esteroideo (AINE) para perros**, con un modo de aplicación innovador.
- Se aplica **sobre las encías**, entre la parte interna de la mejilla y los dientes, y se absorbe a través de la mucosa bucal.
- Esta aplicación se realiza **de manera suave a través de un sistema patentado**, que además asegura la máxima exactitud en la dosificación.
- La medicación **no debe ser ingerida ni digerida**.
- Es un medicamento muy rápido de usar, **sólo debe aplicarse el spray una vez al día**, pasar una toallita húmeda por el difusor y guardarse hasta su próximo uso.

RevitaCAM™
(meloxicam)

¿Cómo debo administrar **RevitaCAM**™?

- 1 Si Usted tiene un perro de tamaño grande (más de 20kg), es mejor sentarse a su lado. Si su perro es de tamaño pequeño, puede situarlo en su regazo, colocando la cara del animal mirando en la dirección opuesta a usted.
- 2 Desde un lado, agarre con suavidad el labio y exponga el área de las encías e interior de la mejilla (ver foto 2).
- 3 También puede usarse colocando el difusor en la comisura labial (ver foto 3).
- 4 Coloque el aplicador justo dentro del labio, en dirección a la parte posterior de la mejilla. Así, la solución entrará en contacto con la parte interna de la mejilla y con las encías.
- 5 Aguantando el vial de pie, apretar completamente el difusor del vial. Debe dejar que éste se recolque en su lugar antes de volver a apretarlo (en caso de ser necesaria más de una pulverización, siempre según prescripción veterinaria).

Recuerde que debe limpiarse las manos justo después de manipular el producto.



¿Cómo se prepara el vial?

- 1 Retire el tapón.
- 2 Inserte el difusor y apriételo enroscando hasta que esté fijado.
- 3 Agite el vial suavemente.
- 4 Para preparar el surtidor, coloque el spray delante de un papel y apriete el spray hasta que salga el líquido. En la primera preparación pueden ser necesarias hasta 10 pulverizaciones.

*Si RevitaCAM no se usa por un período de 48 horas o más, debe prepararse de nuevo el difusor.